

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

# ANABRIC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

*Composición*

Pyrazosulfuron ethyl .....	300 g/l
Aditivos .....	1.0 l
c.s.p.	

Registro Nacional: 106-H6/NA  
CONTENIDO NETO:

LOTE No.  
Fecha formulación:  
Fecha vencimiento:

**Titular del Registro: AGROCHILE S.A.**  
Dirección: Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492,  
piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador. Teléfono: 6020273.  
Email: agrochile@anasac.l

Formulado por:

  
Almirante Pastene 300, Providencia,  
Sgo. Chile  
Tel. 562.24706800 / Fax: 562 24869100

Importado y Distribuido por:

  
"EL COMPINTE DEL AGRO"  
Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr.  
Carlos Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección  
av. 38 C MZ. 263, Guayaquil, Ecuador  
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

v20150128

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Evitar la inhalación del polvo de aspersión y el contacto dermal.

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

## "EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de INHALACIÓN:** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.  
**En caso de CONTACTO CON LA PIEL:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.  
**En caso de CONTACTO CON LOS OJOS:** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.  
**En caso de INGESTIÓN:** no induzca el vómito.  
**Síntomas:** Irritación de piel y ojos, náuseas, vómito y diarrea. **DIAGNOSTICO:** se confirma con análisis de laboratorio, en sangre y orina, - **ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:** No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta"



**EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366)** Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.l

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS.** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

"No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Realizar las aplicaciones con el volumen de agua recomendado para evitar el escurrimiento" "Realizar dos aplicaciones por ciclo de cultivo". "Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo".

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

ANABRIC es un herbicida perteneciente al grupo de las sulfonilureas, recomendado en el cultivo de arroz para el control de malezas ciperáceas y algunas de hoja ancha. Es absorbido por el sistema radicular y foliar, llevado a los meristemas actúa en la inhibición de la enzima acetolactatosintetasa (ALS). En especies sensibles, ANABRIC causa la detención de la división celular y por ello una inhibición del crecimiento foliar y radicular. Los síntomas comienzan con una clorosis leve de tejidos nuevos, luego una necrosis progresiva y finalmente colapso en el sitio del follaje. El efecto sobre las ciperáceas es más lento.

**PREPARACION DE LA MEZCLA: ANABRIC** Se puede aplicar con los equipos convencionales terrestres o tipo espalda. Los tanques se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad del volumen de agua total a utilizar, iniciar agitación y agregar la cantidad recomendada de ANABRIC, finalmente completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo agitación constante para lograr una solución homogénea.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (l/ha)	P.C.
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Botoncillo ( <i>Eclipta alba</i> ) Coquito púrpura ( <i>Cyperus esculentus</i> ) Coquito amarillo ( <i>Cyperus rotundus</i> )	0,08 a 0,10	N.A

\*Con un gasto de agua de 400 l/ha.  
P.C.: Período de carencia, días desde la última aplicación a la cosecha.  
N.A.: No aplica

**ÉPOCAS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

Aplique post emergencia temprana. Aplique sobre las malezas en activo crecimiento. Aplique una vez en la temporada.

**PERÍODO DE REINGRESO:** 12 horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** No existe fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de plaguicidas comunes de uso agrícola, con excepción de productos de reacción ácida y alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas a la aplicación.

**RESPONSABILIDAD:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO**



**CUIDADO**

