

RASTOP BLOQUES

RODENTICIDA
CEBO EN BLOQUES (BB)

Composición

Bromadiolona.....	0,05 g/Kg
Aditivos c.s.p	1.01

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Registro Nacional:
CONTENIDO NETO: 1Kg

LOTE No.

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.:

Titular del Registro: "AGROCHILE S.A."

Dirección: Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492, piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador. Tel: (593) 2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:

Importado y Distribuido por:



ANASAC Chile S.A.

Almirante Pastene 300 - Providencia - Santiago - Chile.

Teléfono: +56 (2) 24869154/24706800
Fax: +56-24869100

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.

Dirección: Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang China

Tel: +86-(0)570-7855158



TÓXICO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Irritante ocular. Cuidado evite el contacto Posible Teratogénico.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

En caso de INHALACIÓN: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cíjorese de que respira sin dificultad. En caso de CONTACTO CON LA PIEL: Retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con agua fría y jabón. En caso de CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de INGESTIÓN: no induzca el vómito. SINTOMAS.- Malestares gástricos y del sistema nervioso. TRATAMIENTO MÉDICO y ANTIDOTO.- No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático. Nota al médico tratante: Administración de una dosis de 25 mg de vitamina K1 (fitomenadiona).

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta"

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAME AL: 1800 - VENENO (836366) Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A. Tel: (593)2-6020273 Quito - Ecuador.
Email: agrochile@anasac.cl

MEDIDAS RELATIVAS PARA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, al eliminar los residuos". "Tóxico para organismos acuáticos". "Tóxico para la fauna". "Respete una franja de seguridad mínima para aplicaciones terrestres de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RASTOP BLOQUES es un rodenticida de segunda generación, elaborado con una selección de diferentes granos y cereales frescos, todos de grado alimenticio humano, mezclados con paraína salida especialmente desarrollados para el control de roedores en granos de maíz almacenados.

MODO DE EMPLEO: Colocar la dosis recomendada en los lugares frecuentados por las ratas, de preferencia en la entrada de las madrigueras o nidos. Dependiendo del grado de consumo, reponer los cebos cada 10 días, como mínimo, hasta que cese el consumo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Rata (<i>Rattus norvegicus</i>)	2 mini bloques / metro lineal o 4 mini bloques/m ²	No aplica

Peso por bloque: 10 g

P.C. Período de carencia:

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: La aplicación de rodenticidas se debe realizar de manera constante, en presencia de roedores. El número de aplicaciones está condicionado al consumo del cebo, se debe aplicar nuevamente si el 50% de los cebos presentan consumo.

PERÍODO DE REINGRESO: No Aplica

FITOTOXICIDAD: No es tóxico ya que no entra en contacto con los vegetales

COMPATIBILIDAD: RASTOP BLOQUES, no se mezclan con otros fitosanitarios

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden en las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: Ia - EXTREMADAMENTE PELIGROSO

