

PRECAUCIONES

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
 - NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.
 - INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.
 - EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.
- NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.**

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR (cuando corresponda).

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del producto usar delantal, protector facial, guantes y botas. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, protector facial, guantes y botas. En caso de realizar una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales. Para aplicaciones aéreas observar las disposiciones que a nivel regional ha establecido la autoridad competente. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA II

DRACO 25 SC, es extremadamente tóxico para organismos acuáticos. Es tóxico para abejas y ligeramente tóxico para aves.-

DESTINO DE LOS ENVASES: LOS ENVASES VACÍOS DEBERÁN SER ENJUAGADOS TRES VECES (TRIPLE LAVADO) Y EL LÍQUIDO RESULTANTE AGREGARLO A LA PREPARACIÓN PARA SER PULVERIZADA, PERFORAR EL ENVASE Y ALMACENE EN LUGAR ADECUADO HASTA POSTERIOR RECICLADO.-



Antídoto: No posee específico.

APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO Y DE RECUPERACIÓN.

Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental, dar papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso (30 g de sulfato de sodio). Procurar asistencia médica de inmediato. Por salpicaduras en piel y ojos, enjuagar con abundante agua limpia. No inducir el vómito.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Llamar al teléfono 021 220-418 del Centro Nacional de Toxicología y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”

Conserve **DRACO 25 SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.

Nota al comprador: El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad. Por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingredientes Activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan a nuestro control el usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos de su aplicación y almacenaje.

DRACO 25 SC

INSECTICIDA

Suspensión Concentrada (SC)

Grupo Químico: Fenil pirazoles

DRACO 25 SC pertenece a una clase de insecticidas de la familia de los fenil pirazoles, este insecticida tiene efecto sobre el sistema nervioso central interfiriendo en la transmisión GABA (ácido gama amino butírico) sobre los canales del ión cloro, por tener una forma de acción distinta a todas las otras familias de insecticidas, este producto es ideal para rotaciones con el objeto de prevenir posibles resistencias.

COMPOSICION:

| | |
|--|-----------|
| Fipronil (*) | 25 % p/v |
| Solventes y emulsionantes, c.s.p | 100 % p/v |
| (*) (1)-5-amino-1-(2,6-dicloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometil sulfenil-pirazole-3-carbonitrilo | |

REGISTRO SENAVE Nro. : 3508

LIBRE VENTA Nro. : 3063

CONTENIDO NETO :

FECHA DE FABRICACION :

FECHA DE VENCIMIENTO :

LOTE Nro. :

CATEGORIA TOXICOLOGICA II

Registrado en Paraguay por ANASAC PARAGUAY SRL

Reg. SENAVE Nro. A.4-SENAVE 1786 A.7-SENAVE 1786

Importador y Distribuidor Exclusivo
en Paraguay:

Fabricante:



Agrícola Nacional S.A.C e I.

Almirante Pastene 300 - Providencia

SANTIAGO - CHILE

Tel: (56-2)4706800

NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO
“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”



NOCIVO

INDICACIONES GENERALES:

DRACO 25 SC, es un insecticida de contacto e ingestión, que actúa sobre insectos del suelo, que atacan las semillas o plantas en los primeros estados de desarrollo en los cultivos de Trigo, Ballica, Remolacha, Maíz y Lupino.

INSTRUCCIONES DEL USO:

| CULTIVOS | PLAGA | Dosis | Momento de aplicación |
|---|--|-------------------------------------|--|
| ARROZ | Gorgojo acuático (<i>Oryzophagus oryzae</i>) | 120 cm ² / 100 kg | Antes de (hasta 30 días) con 1,8 litros de agua por cada 100 kg de semilla |
| GRASOL MAIZ | Hormigas podadoras (<i>Acromyrmex spp.</i>) | 12-16 cm ² / ha | La dosis menor en mezcla con herbicida pre-emergente. La dosis mayor usarla como curativo en post-emergencia. |
| PASTURAS | Tucuras (<i>Dichropis spp.</i> , <i>Rhmannanthocenus pictus</i> <i>Tropinotus spp.</i> , <i>Chomachris miles</i>) | 16 cm ² / ha | Cuando se observen los primeros adultos ó 10 mosquitas o saltanas por metro lineal. |
| SORGO | Astilo moteado (<i>Astylus Atromaculatus</i>) | | Cuando el tercio medio de la panoja tenga los estambres expuestos. |
| En general Áreas cultivadas y no cultivadas | Hormiga minera (<i>Atta sexdens</i>) Hormiga isaú (<i>Atta vollenweideri</i>) Hormiga colorada (<i>Acromyrmex striatus</i>) Hormiga negra del sud (<i>Acromyrmex lobicornis</i>) Hormiga negra común (<i>Acromyrmex lundi</i>) | 1 ml/10 m ² | Aplicar el producto directamente con el envase evitando el contacto con las manos, al lado del camino de abastecimiento (donde están cargando hojas). Próximo a los orificios activos. |
| Césped (parques, canchas de deportes) | Grillo topo (<i>Scapteriscus spp.</i>) | 0.1 – 0.2 ml / ha (cobertura total) | Una sola aplicación por año en primavera (preventiva) o en verano – otoño (curativa). |

| CULTIVO | PLAGA NOMBRE CIENTIFICO | PLAGA NOMBRE COMUN | DOSIS ml/100kg semillas o ha | Dosis g. i.a./100kg semillas o ha |
|---------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| SOJA | <i>Diabrotica Speciosa</i> | Vaquita | 200 ml | 50 ml |
| | <i>Stemecus sp</i> | Picudos | 200 ml | 50 ml |
| | <i>Elasmopalpus lignosellus</i> | Broca de tallo | 200 ml | 50 ml |
| | <i>Anurogillus sp</i> | Grillo | 200 ml | 50 ml |
| | <i>Aracantus mourei</i> | Cuscutito marrón | 200 ml | 50 ml |

MÉTODOS DE APLICACIÓN: DRACO 25 SC. Tratamiento en húmedo del producto sobre la semilla, aplicando agua para mejor adherencia. Para un control eficiente. Se recomienda que la aplicación de **DRACO 25 SC** se realice con semillas mezcladas en forma homogénea con el producto, de modo de asegurar una buena cobertura. Con este fin se recomienda combinar **DRACO 25 SC** con 0,5 – 1,0 L de agua por cada 100 kilos y según tipo de semilla. Para obtener un buen cubrimiento, mezcle la dosis recomendada de **DRACO 25 SC** con la semilla en máquinas para tratamiento de semilla o en tambor giratorio, agitando hasta obtener una distribución homogénea. Adicionar 0,5 a 1,0 L de agua por cada 100 kilos de semilla, para logra mayor adherencia.

RESTRICCIONES DE USO: Por época de aplicación, no está afecta a carencias para el consumo humano. Las semillas tratadas con **DRACO 25 SC** deben ser destinadas únicamente para la siembra; no deben ser consumidas por el hombre ni por animales.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se puede mezclar con funguicidas. Es incompatible con productos de reacción alcalina. En caso de utilizarlo en mezcla se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: DRACO 25 SC no es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

INICIO, NÚMERO E INTERVALO DE APLICACIÓN: Debe de aplicarse antes de realizar la siembra, es un tratamiento de semillas. Por el cual se realiza una sola vez en la temporada.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: El ingreso al área de tratamiento de semillas debe ser con equipo completo de protección, o bien esperar 24 horas para ingresar sin equipo de protección.

