

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“CONSERVÉSE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

# CRECITEC-B

**FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO  
USO AGRÍCOLA**

**Composición:**

Boro .....3,3% p/p  
N Total .....5,7% p/p

Complejo Alcohol - Azúcares

**CONTENIDO NETO:**

**FORMULADO POR**



ANASAC CHILE S.A  
Almirante Pastene 300, Providencia - Santiago, Chile

**MODO DE EMPLEO:** El producto puede ser aplicado vía foliar o fertiriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua agregue la dosis del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación.

**FUNCIÓN:** **Crecitec Boro** es un Fertilizante Foliar en base a Boro, Nitrógeno y Complejo alcoholes-azúcares. Desde el punto de vista nutricional aporta Boro, esencial en la formación de la pared celular, siendo importante en la formación de proteínas. Junto con esto forma complejos azúcar/boro asociados a la transmisión de azúcares en la planta. Es un producto con excelentes características de absorción foliar, translocación y eficiencia ya que el Complejo alcoholes-azúcares es la forma natural que utilizan las plantas para trasladar Boro.

**INSTRUCCIONES DE USO: DOSIS DE APLICACIÓN: 1 – 2 Lts/200 Lts de agua**

CULTIVO	RECOMENDACIONES DE USO
Arroz	Aplicar cuando la planta tenga 5 hojas y repetir antes del inicio de floración y cuando la planta presente deficiencias de este elemento.
Tomate, Ajíes	Aplicar a los 15 días del trasplante, en prefloración, al inicio del desarrollo de frutos y repetir cada 15 días hasta la salida del cultivo.
Papa	Aplicar desde el inicio de la formación del tubérculo
Melón, Sandía	Aplicar antes del inicio de floración y repetir entre 15 a 21 días hasta la salida del cultivo.
Frutales y Cítricos	Aplicar antes del inicio de floración y repetir cada 21 a 30 días hasta la salida del cultivo.
Habichuelas	Aplicar antes del inicio de floración y repetir cada 21 a 30 días
Otras hortalizas: Col, Coliflor, Brócoli, Zanahoria, Remolacha, Apio	Cuando la planta tenga de 5 a 6 hojas. Hacer una aplicación antes del inicio de la formación de la inflorescencia. Repetir cada 2 a 3 semanas.
Ajo, Cebolla	Aplicar cuando comienza la formación de bulbo.
Bananos y Plátanos	Aplicar al inicio de la floración y repetir cada 15 a 21 días.

**PRECAUCIONES:**

- Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: Pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes.
- No aplicar en horas de máximo calor.
- Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos.

**COMPATIBILIDAD:** **CreciTec B** es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes de uso común, salvo los de reacción muy alcalina

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL**

**PAÍS: REPÚBLICA DOMINICANA**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**FECHA DE FORMULACIÓN:**

**N° DE LOTE:**

