

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CRECITEC-Ca

FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO
USO AGRÍCOLA

Composición:

Ca como CaO 10% p/p

Complejo Alcohol - Azúcares

CONTENIDO NETO:

FORMULADO POR



ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300, Providencia - Santiago, Chile

MODO DE EMPLEO: El producto puede ser aplicado vía foliar o fertiriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua agregue la dosis del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación.

FUNCIÓN: Crecitec-Calcio es un Fertilizante Foliar en base a Calcio y Complejo alcoholes-azúcares. Desde el punto de vista nutricional aporta calcio, el que promueve el alargamiento celular, fortalece la estructura de la pared celular, ayuda a proteger la planta contra el estrés de temperatura alta, y mejora la calidad de la fruta entre otras funciones. Debido a la presencia del Complejo alcoholes-azúcares es de fácil penetración, lo que confiere buena sistemía, pues sus elementos son asimilables en su totalidad

INSTRUCCIONES DE USO: Ponga la tercera parte de agua en el tanque. Agregue la cantidad correcta de Crecitec-Calcio. Si va a usar otros agroquímicos, adiciónelos en este momento. Complete el tanque con el volumen de agua necesario y mezcle. Agite adecuadamente hasta que quede bien mezclado.

CULTIVO	RECOMENDACIONES DE USO
Arroz	Aplicar en periodo de formación y llenado de grado.
Tomate, Ajíes	Aplicar después de trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.
Papa	Aplicar en los primeros estados. Repetir aplicaciones según necesidad del cultivo.
Melón, Sandía	Aplicar después de trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.
Frutales y Cítricos	Aplicar después de trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.
Otras hortalizas: Col, Coliflor, Brócoli, Zanahoria, Remolacha, Apio	Aplicar desde los 21 días, cada 15 días.
Ajo, Cebolla	Aplicar después de trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.
Bananos y Plátanos	Aplicar a partir del tercer mes de establecidas las plantas en intervalos de 15 días hasta la salida del cultivo.

PRECAUCIONES:

- Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: Pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes.
- No aplicar en horas de máximo calor.
- Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos.

COMPATIBILIDAD: Crecitec Ca es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes de uso común, salvo los de reacción muy alcalina

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL

PAÍS: REPÚBLICA DOMINICANA

FECHA DE VENCIMIENTO:

FECHA DE FORMULACIÓN:

N° DE LOTE:

