

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

# CRECITEC-Mg

FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO  
USO AGRÍCOLA

**Composición:**

Mg como Mg2+ ..... 4% p/p

N Total ..... 4,6% p/p

Complejo Alcohol - Azúcares

**CONTENIDO NETO:**

**FORMULADO POR**



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300, Providencia - Santiago, Chile

**MODO DE EMPLEO:** El producto puede ser aplicado vía foliar o fertiriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua agregue la dosis del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación.

**FUNCIÓN: Crecitec-Magnesio** es un Fertilizante Foliar en base a Magnesio, Nitrógeno y Complejo alcoholes-azúcares. Desde el punto de vista nutricional aporta magnesio, el que es clave para una amplia gama de funciones en los vegetales, incluyendo el proceso de la fotosíntesis, ya que es un componente básico de la clorofila, la molécula que da a las plantas su color verde. El producto cuenta con excelentes características de absorción foliar, translocación y eficiencia ya que el Complejo alcoholes-azúcares constituye la forma natural que utilizan las plantas para trasladar magnesio

**INSTRUCCIONES DE USO: DOSIS DE APLICACIÓN: 1,5 – 2 Lts/200 Lts de agua**

CULTIVO	RECOMENDACIONES DE USO
Arroz	Aplicar 15 días después de la emergencia, en prefloración, repetir después cada 15 días o cuando existan deficiencias
Tomate, Ajíes	Aplicar a los 15 ó 20 días después del trasplante, las subsecuentes, realizarlas cada 10 días y después del primer corte, o bien cuando exista deficiencia.
Papa	Aplicar 15 días después de la emergencia, en el periodo vegetativo y en inicio de crecimiento de tubérculos.
Melón, Sandía	Aplicar a los 15 ó 20 días después del trasplante, las subsecuentes, realizarlas cada 10 días y después del primer corte, o bien cuando exista deficiencia.
Frutales y Cítricos	Aplicar en inicio de floración, cuajado y desarrollo de fruto hasta que el alcance el 50% de su tamaño.
Otras hortalizas: Col, Coliflor, Brócoli, Zanahoria, Remolacha, Apio	Aplicar a los 15 ó 20 días después del trasplante, las subsecuentes, realizarlas cada 10 días y después del primer corte, o bien cuando exista deficiencia.
Ajo, Cebolla	Aplicar a los 15 a 20 días de emergidas las plantas y al inicio de la formación del bulbo
Caña de Azúcar	Aplicar desde etapa de pelillo y durante su desarrollo, o cuando se presenten los bandeados en hojas por la deficiencia. Realizar las aplicaciones distanciadas en periodos de 15 días.

**PRECAUCIONES:**

- Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: Pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes.
- No aplicar en horas de máximo calor.
- Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos.

**COMPATIBILIDAD: CreciTec Mg** es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes de uso común, salvo los de reacción muy alcalina

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL**

**PAÍS: REPÚBLICA DOMINICANA**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**FECHA DE FORMULACIÓN:**

**N° DE LOTE:**

