

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

# CRECITEC-Zn

**FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO  
USO AGRÍCOLA**

**Composición:**

Zn como Zn2+ ..... 7% p/p

N Total ..... 3% p/p

Complejo Alcohol - Azúcares

**CONTENIDO NETO:**

**FORMULADO POR**



ANASAC CHILE S.A  
Almirante Pastene 300, Providencia-Santiago, Chile

**MODO DE EMPLEO:** El producto puede ser aplicado vía foliar o fertiriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua agregue la dosis del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación.

**FUNCION:** Crecitec-Zinc es un Fertilizante Foliar en base a Zinc, Nitrógeno y Complejo alcoholes-azúcares. Desde el punto de vista nutricional aporta zinc, con excelentes características de absorción foliar, translocación y eficiencia ya que el Complejo alcoholes-azúcares constituye la forma natural que utilizan las plantas para trasladar zinc

**INSTRUCCIONES DE USO:**

CULTIVO	DOSES	OBSERVACIONES
Frutales	1-2 Lts/200 Lts agua	Efectuar 1 a 3 aplicaciones, a partir de puntas verdes
Aguacate	1-2 Lts/200 Lts agua	Efectuar 1 a 2 aplicaciones, antes de floración
Frijol	1-2 Lts/200 Lts agua	Aplicar antes de floración y durante la formación de vainas.
Arroz	1-2 Lts/200 Lts agua	Aplicar la dosis baja al aparecer la espiga. Aplicar la dosis alta con mayor volumen de agua en caso de deficiencias severas
Tomate	1-2 Lts/200 Lts agua	De 10 a 15 días después del trasplante. Repetir cada 15 días durante desarrollo vegetativo hasta antes de la floración
Papa	1-2 Lts/200 Lts agua	Aplicar 15 días después de la emergencia y repetir cada dos semanas hasta la formación del tubérculo
Melón, Sandía	1-2 Lts/200 Lts agua	De 10 a 15 días después del trasplante. Repetir cada 15 días durante desarrollo vegetativo hasta antes de la floración
Ajo y Cebolla	1-2 Lts/200 Lts agua	1º aplicar 15 días después de emergencia y/o trasplante, una 2º a las dos semanas y una 3º al inicio del desarrollo del bulbo
Bananos y Plátanos	1-2 Lts/200 Lts agua	Aplicar al presentarse deficiencias de zinc
Caña de azúcar	1-2 Lts/200 Lts agua	Aplicar a los 30 y 60 cms de altura

**PRECAUCIONES:**

- Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: Pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes.
- No aplicar en horas de máximo calor.
- Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos.

**COMPATIBILIDAD:** CreciTec Zn es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes de uso común, salvo los de reacción muy alcalina

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL**

**PAÍS: REPÚBLICA DOMINICANA**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**FECHA DE FORMULACIÓN:**

**Nº DE LOTE:**

