

# Kamikaze

**FUNGICIDA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**N° de Registro: 4980**

**Titular del Registro: ANASAC DOMINICANA**

**País: REPÚBLICA DOMINICANA**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**Ingrediente Activo:**

<b>AZOXYSTROBIN</b> .....	<b>12.0% m/v</b>
<b>TEBUCONAZOLE</b> .....	<b>20.0% m/v</b>
<b>Ingredientes inertes</b> .....	<b>72.0% m/v</b>

**GENERALIDADES**

**KAMIKAZE 32 SC** es un fungicida de acción sistémica, preventiva, curativa y erradicante.

**RECOMENDACIONES DE USO**

<b>CULTIVO</b>	<b>ENFERMEDAD</b>	<b>DOSIS (lts/ha)</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Añublo de la vaina ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	0.8	Aplique con un volumen de agua de 200 L/ha.
	Manchado de los granos ( <i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Curvularia oryzae</i> , <i>Sarocladium oryzae</i> )	1	
Cebolla ( <i>Allium cepa</i> ) Ajo ( <i>Allium sativum</i> )	Mancha púrpura ( <i>Alternaria porri</i> )	0,4	
Café ( <i>Coffea arabica</i> )	Roya ( <i>Hemileia vastatrix</i> )	1.0	
Frijol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> )	Antracnosis ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )	0.5	
Maíz ( <i>Zea mays</i> )	Mancha de asfalto ( <i>Phyllachora maydis</i> , <i>Monographella maydis</i> , <i>Coniothyrium phyllachorae</i> )	0.5	
Papaya ( <i>Carica papaya</i> )	Antracnosis ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )	0.4 – 0.6	
Zanahoria ( <i>Dacus carota</i> )	Alternaria ( <i>Alternaria dauci</i> )	0.6	

Tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ) Pimentón ( <i>Capsicum annuum</i> ) Ajíes ( <i>Capsicum anuum</i> ) Berenjena ( <i>Solanummelongena</i> )	Alternaria ( <i>Alternaria solani</i> )	0.8	
Banano ( <i>Musa sapientum</i> ) Plátano ( <i>Musa paradisiaca</i> )	Sigatoka Negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> )	1,0	
Melón ( <i>Cucumis melo</i> ) Sandía ( <i>Citrullus vulgaris</i> )	Alternaria ( <i>Alternaria sp.</i> )	0,5 – 0,6	

### EQUIPO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse con equipo terrestre, aspersora de mochila o equipo accionado por tractor, con un volumen de agua de 200L/ha. Por avión debe aplicarse con un volumen de agua de 40 L/ha. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme. Antes de aplicar KAMIKAZE 32 SC calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secar y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal, antes de usar y manipular este producto.

### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Medir la dosis requerida de KAMIKAZE 32 SC y diluir previamente en un balde con agua, luego agregar al estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y el agitador en marcha. Terminar de llenar el estanque y aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento. Al finalizar la aplicación, lavar el equipo prolijamente para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Detalle en cuadro de usos.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA:** Arroz: 35 días, Cebolla: 14 días, Ajo: 7 días, Café: 15 días, Frijol: 3 días, Maíz: 15 días, Papaya: 3 días, Zanahoria: 21 días Tomate, Pimentón, Ajíes, Berenjena: 7 días, Banano, Plátano: 18 días, Melón, Sandía: 12 días. Banano, plátano: 18 días. Ajo: 7 días. Meón y sandía: 12 días.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Se recomienda 12 horas antes de reingresar a las áreas tratadas o relizar cualquier labor en las mismas.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. En caso de duda con respecto a la compatibilidad del producto realizar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Los usuarios del producto, deben lavarse bien las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Lavar abundantemente después de usar. No trabajar en la neblina del líquido o con viento. Para la mezcla, aplicación del producto y lavado de equipo de aplicación, use la ropa de protección: sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. El filtro de la

mascarilla debe cambiarse a menudo. Evitar el contacto directo con el producto. Evite aspirar la llovizna de aspersión. Bañarse con suficiente agua y jabón después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia. Use ropa limpia en cada jornada de trabajo. No lave la ropa de trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal.

#### **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de los niños y los alimentos domésticos. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**

**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**

#### **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

**INGESTIÓN:** Se pueden producir vómitos y diarrea. Además, se pueden producir síntomas sistémicos como sedación, incoordinación locomotora, dolor al caminar.

**CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS:** Puede provocar irritación moderada.

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** Ante una gran ingestión, diluya con agua o suero salino, realice una aspiración cuidadosa. Solo si es necesario proceda al lavado gástrico, muy cuidadoso debido a la presencia de solvente y de agentes tensioactivos. Luego administre 20 gramos de carbón activado suspendidos en suero salino, como adsorbente. Sólo si no se ha presentado motilidad gástrica ni diarrea, administre laxante salino (20 gramos en 500 cc de agua).

**ANTIDOTO:** NO TIENE.

#### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

**TOXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**EN CASO DE DERRAMES, AISLAR LA ZONA AFECTADA, SI ES POSIBLE CONTENER EL DERRAME CON SUSTANCIAS INERTES.**

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.  
NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA  
O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL  
CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE  
MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

#### **MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES**

Los envases vacíos lávelos con agua, destrúyalos perforándolos para evitar su reutilización. Una vez  
inutilizados, trasladar a la empresa distribuidora, quien se encargará de remitir al centro de acopio.

Aplicar TRIPLE LAVADO a los envases utilizados. Un envase lavado tres veces reduce el riesgo de  
contaminación humana, animales domésticos y medio ambiente. Recomendamos proceder de la siguiente  
forma: después de escurrir bien el envase, agregar agua limpia al envase vacío, hasta la cuarta parte de  
su capacidad, taparlo y agitarlo por 30 segundos. Luego vaciar el contenido en el tanque de mezcla. Esta  
acción deberá repetirse dos veces más. Después el envase deberá ser perforado para evitar su  
reutilización.

#### **PRESENTACIONES:**

**Importado y distribuido por:**

**Titular del registro:**

**ANASAC DOMINICANA**

Calle Victor Garrido Puello N° 14. Edificio  
profesional Doña Ana Suite 203, Piantini.  
Santo Domingo, República Dominicana

### **USO AGRONÓMICO ATENCIÓN**

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADAR AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MAS CERCANO Y  
ENTREGUE LA ETIQUETA O EL PANFLETO. COMUNIQUESE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE  
DROGAS Y DE INTOXICACIONES (1-809) 562-6601 Ext. 1801.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”**  
**“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA  
ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”**  
**“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE  
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”**  
**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”**  
**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES  
DE AGUA”**  
**“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

#### **INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de  
calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en  
la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin  
embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones  
ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador



acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.