

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

CALCIO (Ca)	7,0% p/p
NITROGENO (N)	4,9% p/p

GENERALIDADES

CRECITEC Ca es un abono foliar a base de N y Ca. Desde el punto de vista nutricional aporta Calcio (Ca), además de corregir deficiencias de estos elementos durante las etapas de mayor consumo, potencia los sistemas naturales de defensa de las plantas. Debido a su novedosa formulación de alta absorción y compatibilidad, le confiere buena sistemía, pues sus elementos son asimilables en su totalidad. **CRECITEC Ca** puede ser aplicado vía foliar. Proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos.

RECOMENDACIONES DE USO: Dosis para 200 L de agua.

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES DE USO	VÍA DE APLICACIÓN
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	1 a 2 L/ha	Aplicar en periodo de formación y llenado de grano.	Vía foliar o fertirriego
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>) Ajíes (<i>Capsicum annuum</i>)	1 a 2 L/ha	Aplicar después de trasplante (15 días) con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.	Vía foliar o fertirriego
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	1 a 2 L/ha	Aplicar en los primeros estados. Repetir aplicaciones según necesidades del cultivo.	Vía foliar o fertirriego
Melón (<i>Cucumis melo</i>), Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	1 a 2 L/ha	Aplicar después del trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.	Vía foliar o fertirriego
Otras hortalizas: Col, Coliflor, Brócoli, Zanahoria, Remolacha, Apio.	1 a 2 L/ha	Aplicar desde los 21 días, cada 15 días.	Vía foliar o fertirriego
Ajo (<i>Allium sativum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	1 a 2 L/ha	Aplicar después del trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.	Vía foliar o fertirriego

Banano, Plátano (<i>Musa x paradisiaca</i>)	1 a 2 L/ha	Aplicar a partir del tercer mes de establecidas las plantas en intervalo de 15 días hasta la salida del cultivo.	Vía foliar o fertirriego
Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	1 a 2 L/ha	Realizar 2 a 4 aplicaciones a partir de preflor.	Vía foliar o fertirriego
Café (<i>Coffea arabica</i>), Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	1 a 2 L/ha	Realizar 2 aplicaciones a partir de cuajado de fruto.	Vía foliar o fertirriego
Fresa (<i>Fragaria x ananassa</i>), Arándano (<i>Vaccinium myrtillus</i>), Frambuesa (<i>Rubus idaeus</i>)	1 a 2 L/ha	Realizar 2 a 3 aplicaciones a partir de frutos cuajados en desarrollo intermedio, repitiendo cada 7 días.	Vía foliar o fertirriego
Frutales y Cítricos	1 a 2 L/ha	Aplicar después del trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.	Vía foliar o fertirriego

“La información presentada sirve como referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”.

FORMA DE APLICACIÓN

El producto puede ser aplicado vía foliar o fertirriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos.

EQUIPO DE APLICACIÓN

A pesar de que el producto es inocuo y no presenta un peligro para el aplicador, deben ser tomadas las precauciones siguientes: Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: Pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes.

PRECAUCIONES

No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos.

INCOMPATIBILIDAD: CRECITEC Ca es incompatible con productos de aplicación agrícola de reacción muy alcalina. El pH óptimo de la mezcla de aplicación es entre 5 y 8.

PRESENTACIONES: 100, 250, 500 ml, 1, 5, 10, 20 y 200 litros.

“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO”



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366)
 Atención las 24 horas del día o al Titular del Registro AGROCHILE S.A.
 Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

FABRICANTE Y FORMULADOR:
ANASAC CHILE S.A.
 Almirante Pastene 300, Providencia.
 Santiago-Chile.
 Teléfono: (56-2) 24706800


TITULAR DEL REGISTRO:
AGROCHILE S.A.
 Valderrama N31-27 y Av. Mariana de
 Jesús, conjunto La Granja Bloque ED
 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito,
 Ecuador. Teléfono: 6020273

<p>“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS” “EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD” “REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES” “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS” “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA” “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”</p>	
---	---

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



www.anasac.com/international