

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

MAGNESIO (MgO) 6,6% p/p
NITROGENO (N) 4,6% p/p

GENERALIDADES

CRECITEC Mg es un abono foliar a base de N y Mg. Desde el punto de vista nutricional aporta Magnesio (Mg), además de corregir deficiencias de estos elementos durante las etapas de mayor consumo. Debido a su novedosa formulación de alta absorción y compatibilidad, le confiere buena sistemía, pues sus elementos son asimilables en su totalidad. **CRECITEC Mg** puede ser aplicado vía foliar. Proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos.

RECOMENDACIONES DE USO: Dosis para 200 L de agua.

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES	VÍA DE APLICACIÓN
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	1,5 a 2 L/ha.	Aplicar 15 días después de la emergencia, en prefloración, repetir después cada 15 días o cuando existan deficiencias.	Vía foliar o fertirriego
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Ajíes (<i>Capsicum annuum</i>)	1,5 a 2 L/ha.	Aplicar a los 15 o 20 días después del trasplante, las subsecuentes, realizarlas cada 10 días y después del primer corte, o bien cuando exista deficiencia.	Vía foliar o fertirriego
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	1,5 a 2 L/ha.	Aplicar 15 días después de la emergencia, en el periodo vegetativo y en inicio de crecimiento de tubérculos.	Vía foliar o fertirriego
Melón (<i>Cucumis melo</i>), Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	1,5 a 2 L/ha.	Aplicar a los 15 o 20 días después del trasplante, las subsecuentes, realizarlas cada 10 días y después del primer corte, o bien cuando exista deficiencia.	Vía foliar o fertirriego
Frutales y Cítricos	1,5 a 2 L/ha.	Aplicar en inicio de floración, cuajado y desarrollo de fruto hasta que el alcance el 50% de su tamaño.	Vía foliar o fertirriego

Otras hortalizas: Col (<i>Brassica oleracea var. capitata</i>), Coliflor (<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>), Brócoli (<i>Brassica oleracea var. italica</i>), Zanahoria (<i>Daucus carota</i>), Apio (<i>Apium graveolens</i>)	1,5 a 2 L/ha.	Aplicar a los 15 o 20 días después del trasplante, las subsecuentes, realizarlas cada 10 días y después del primer corte, o bien cuando exista deficiencia.	Vía foliar o fertirriego
Ajo (<i>Allium sativum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	1,5 a 2 L/ha.	Aplicar a los 15 a 20 días de emergidas las plantas y al inicio de la formación del bulbo.	Vía foliar o fertirriego
Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	1,5 a 2 L/ha.	Realizar aplicaciones con brotes de 30 y 60 cm. 2 a 3 aplicaciones entre bayas cuajadas y pinta.	Vía foliar o fertirriego
Café (<i>Coffea arabica</i>), Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	1,5 a 2 L/ha.	Realizar 1 a 2 aplicaciones antes de la floración.	Vía foliar o fertirriego
Banano, Plátano (<i>Musa x paradisiaca</i>)	1,5 a 2 L/ha.	Aplicar en cuajado y desarrollo de fruto hasta que el alcance el 50% de su tamaño.	Vía foliar o fertirriego

“La información presentada sirve como referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”.

FORMA DE APLICACIÓN

El producto puede ser aplicado vía foliar o fertirriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos.

EQUIPO DE APLICACIÓN

A pesar de que el producto es inocuo y no presenta un peligro para el aplicador deben ser tomadas las precauciones siguientes: Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: Pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes.

PRECAUCIONES

No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos.

INCOMPATIBILIDAD: CRECITEC Mg es incompatible con productos de aplicación agrícola de reacción muy alcalina. El pH óptimo de la mezcla de aplicación es entre 5 y 8.

PRESENTACIONES: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l.

“CONSERVÉSE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO”



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366)
 Atención las 24 horas del día o al Titular del Registro AGROCHILE S.A.
 Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl



FABRICANTE Y FORMULADOR:
ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300, Providencia.
Santiago-Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800


TITULAR DEL REGISTRO:
AGROCHILE S.A.
Valderrama N31-27 y Av. Mariana de
Jesús, conjunto La Granja Bloque ED
231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito,
Ecuador. Teléfono: 6020273

<p>“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS” “EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD” “REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES” “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS” “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA” “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”</p>	
---	---

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



www.anasac.com/international