



INSECTICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC) N° de registro: 156-I1/NA

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

ular del Registro: AGROCHILE S.A. País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

| FIPRONIL | 157 q/l |
|--|---------|
| IMIDACLOPRID | |
| Copolimero hidrofilico de metilmetacrilato | |
| Aditivos c.s.p | 11 |

GENERALIDADES

TRUEKE es un insecticida selectivo, sistémico de contacto e ingestión.

RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|--|---------------------|---|
| Arroz (Oryza sativa) | Mosca minadora (Hydrellia sp) | 0.350 l/ha* | Aplicar en presencia de la plaga considerando siempre el umbral de daño económico. Realizar una aplicación por ciclo para evitar la formación de resistencia. |
| Rosa (Rosa sp) | Trips (Frankliniella occidentalis) | 0.16 ml/l agua** | Aplicar cuando se presenten las primeras infestaciones de Trips, si es necesario por la infestación de la plaga, repetir las aplicaciones cada 7 días. |
| Papa (Solanum tuberosum) | Gusano blanco (Premnotrypes vorax) | 0.20 l/ha* | Aplicar en presencia de la plaga considerando siempre el umbral de daño económico. Realizar tres aplicaciones cada 30 días durante todo el ciclo del cultivo. |

^{*}Con un gasto de agua de 400 l/ha.

MODO DE EMPLEO

Para la preparación, en un recipiente adecuado, mezclar la dosis recomendada de TRUEKE con un poco de agua hasta formar una suspensión homogénea, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

^{**}Con un gasto de agua de 1100 l/ha.



COMPATIBILIDAD: No compatible con productos fuertemente alcalinos o ácidos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

FITOTOXICIDAD: El producto no presenta problemas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se utiliza a la dosis recomendada en la etiqueta.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Al área tratada 24 horas después de la aplicación.

PERIODO DE CARENCIA: 30 días para Arroz y Papa; No corresponde para Rosa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, aspersión o vapor). Causa irritación moderada a los ojos. Evitar contacto con la piel y la ropa.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

<u>En caso de contacto ocular:</u> Lavar los ojos inmediatamente con agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de contacto cutáneo: Retírese la ropa y lave la piel con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de ingestión: No induzca al vómito.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Fatiga, contracción y debilidad muscular, calambres y posible disminución de la capacidad respiratoria, vómito, agitación y convulsiones.

TRATAMIENTO MEDICO Y ANTIDOTO: El tratamiento es sintomático y de soporte, no hay antídoto específico.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Tóxico para peces, no contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos. Tóxico para abejas, evitar aplicar en cultivos en etapa de floración o en un horario de 9 – 16 horas que es de mayor actividad para las abejas. Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo y con equipos calibrados para evitar escurrimiento. Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales que no estén destinados para el consumo humano.

PRESENTACIONES:



Importado y distribuido por: FARMAGRO

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263. Guayaquil, Ecuador Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

Titular del registro: AGROCHILE S.A.

Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492, piso 10, of. 1005, Quito, Ecuador. Teléfono (593) 2-6020273. agrochile@anasac.cl

USO AGRICOLA CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 1800-VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS AL DÍA O AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE TEL: (593) 26020310

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS"
"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA
ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"
"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS"
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES
DE AGUA"

"NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO"
"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

"ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.