

ANASAC^{full}

FERTILIZANTE FOLIAR
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)
N° de Registro: 894-F-4179-23
Titular: AGROCHILE S.A.
País: GUATEMALA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Macronutrientes primarios:

Nitrógeno (N):	8,42% p/v
Fósforo (P ₂ O ₅):	2,75% p/v
Potasio (K ₂ O):	0,24% p/v
Azufre (S):	8,88% p/v
Zinc (Zn):	0,26% p/v
Boro (B):	0,49% p/v
Ingredientes inertes	78,96% p/v

GENERALIDADES

ANASAC FULL puede ser utilizado de manera foliar y por goteo con cualquier equipo de aplicación: manual, mecánico o aéreo.

RECOMENDACIONES DE USO

DOSIS Y CULTIVOS: Aplicaciones al follaje y por goteo.

CULTIVO	APLICACIONES AL FOLLAJE
Palma africana (<i>Elaeis guineensis</i>)	1,5 – 2% del volumen del caldo por aplicación.
Cítricos (<i>Citrus spp</i>) y otros frutales	Aplicar hasta inicio de floración.
Viveros y Ornamentales	3 - 4 aplicaciones desde inicio de crecimiento activo y después cada 15 días.
Tomates (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	Aplicar durante crecimiento de la planta hasta un mes antes de cosecha. Aplicar a través del riego 4 L/ha.
Melón (<i>Cucumis melo</i>), Pepino (<i>Cucumis sativus</i>), Calabaza (<i>Cucurbita máxima</i>), Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	2 - 3 aplicaciones desde crecimiento de cultivo, cada 15 - 20 días. Aplicación a través del riego en Sandía: 4 Lt/ha.
Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>), Col y Coliflor (<i>Brassica napus</i>), Apio (<i>Apium fistulosum</i>), Repollo (<i>Brassica oleracea</i>)	Aplicaciones desde 4 - 5 hojas cada 15 - 20 días.
Frijol, Ejote Frances (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Pimiento (<i>Capsicum annum</i>), Chile (<i>Capsicum spp</i>), Arveja (<i>Pisum sativum</i>)	Durante el crecimiento activo de cultivo.

Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	500 cc/ha. 2 aplicaciones en macolla.
Ajo (<i>Allium porrum</i>), Cebollas (<i>Allium fistulosum</i>), Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	3 aplicaciones para estimular el crecimiento, cada 21 días.
Césped	Aplicar al inicio del crecimiento y continuar con intervalos de 3 - 4 semanas. Adicionalmente después de periodos de estrés o alto tráfico, heladas o resiembra.
Banano (<i>Musa sapientum</i>)	Varias aplicaciones, 20 días post-siembra.
Caña de azúcar, cafeto	
Cultivos hortícolas	1 - 1,5% del volumen del caldo por aplicación.
Floricultura	1% del volumen del caldo por aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO

ANASAC FULL puede ser utilizado de manera foliar y por goteo con cualquier equipo de aplicación: manual, mecánico o aéreo. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo utilizando únicamente agua. El producto no ejerce ninguna acción física ni química sobre el equipo de aplicación. Como mínimo lavar 3 veces con suficiente agua el equipo de aplicación después de usar el producto. Dada su formulación el producto puede ser aplicado en mezcla con herbicidas, insecticidas y fungicidas, mejorando las características del caldo de aplicación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llene el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad, posteriormente agregue la dosis correcta de **ANASAC FULL**, agite nuevamente hasta que se homogenice la mezcla y termine de llenar el tanque, posteriormente hacer la aplicación.

COMPATIBILIDAD: PK, es compatible con la mayoría de los plaguicidas que se usan comúnmente. En caso de duda hacer prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No se conocen síntomas de fitotoxicidad cuando se aplican las dosis recomendadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Cuando utilice este producto póngase el equipo de protección personal: overol de mangas largas, mascarilla, anteojos, botas y guantes de hule. No coma, fume o beba durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto. Báñese después de cada jornada de trabajo con suficiente agua y jabón, la ropa de trabajo lávela antes de volverla a utilizar.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Este producto no debe almacenarse ni transportarse con forrajes, alimentos, medicamentos y utensilios de uso personal o pecuario. Manténgase el producto en un lugar fresco y aireado, en su envase original y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y a la luz, no es corrosivo.

SINTOMAS DE INTOXICACION: No presenta ningún síntoma de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: Si el paciente está consiente dé a beber suficiente agua. Busque atención médica inmediata.

INHALACION: Retire el paciente a un lugar ventilado y seco. Afloje las prendas de vestir.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente la parte afectada con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.


NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: Tratamiento sintomático. No tiene antídoto específico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y EL AMBIENTE: No aplique cerca de fuentes de agua, no contamine lagos, ríos o estanques. En caso de derrames recójalos con aserrín o algún material absorbente e incorpórelo al campo de cultivo, los envases vacíos lávelos 3 veces perfórelos y llévelos al centro de recolección más cercano.

Importado y distribuido por:

Titular del registro:
AGROCHILE S.A.

<p>“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS” “EN CASO DE INTOXICACION LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA” “REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES” “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS” “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA” “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”</p>	
---	---

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El formulador y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Garantizamos el contenido del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado. El usuario asume el riesgo de los daños ocasionados por factores que escapan a la responsabilidad del formulador y adquiere el producto con pleno conocimiento de ellos.