

PHYLLUM MAX F[®]

BIOESTIMULANTE
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)
N° de Registro: 894-SAF-111-23
Titular: AGROCHILE S.A.
País: GUATEMALA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

EXTRACTO DE ALGAS 49,0% p/v

*CONTENIDO:

CITOQUININAS 1216 ppm
BETAINAS 20 ppm
AUXINAS 16 ppm
GIBERELINAS 4 ppm

GENERALIDADES

PHYLLUM MAX F es una sustancia afín líquida que puede ser utilizado de manera foliar y al suelo con cualquier equipo de aplicación: manual, mecánico o aéreo, destinado a suplirle a la planta los elementos mayores y menores requeridos para el buen desarrollo de los cultivos.

RECOMENDACIONES DE USO

DOSIS Y CULTIVOS: Aplicaciones al follaje y por goteo.

CULTIVO	OBSERVACIONES
Papa	Aplicar al inicio de formación de tubérculos y repetir durante tuberización.
Vivero, Ornamental	3 - 4 aplicaciones desde inicio de crecimiento activo y después cada 15 días.
Tomate, Tabaco	Aplicar durante el crecimiento del fruto hasta un mes antes de cosecha. Aplicar a través del riego 4 L/ha.
Pomáceas	Aplicar desde brotación hasta inicio de floración.
Melón, Pepino, Calabaza, Sandía	3-7 aplicaciones desde crecimiento de fruto, cada 15-20 días. Aplicación a través del riego en Sandía: 4 Lt/ha.
Ajo, Cebolla	3 aplicaciones para estimular el crecimiento, cada 21 días.
Cítricos y frutales	Aplicar hasta inicio de floración.
Frejol, Arveja, Pimiento	Durante el crecimiento activo de frutos.
Arroz	500 cc/200 L de agua. 2 aplicaciones en macolla e inicio de espiga.

Repollo Apio, Col, Coliflor	Aplicaciones desde 4-5 hojas cada 15-20 días.
Café	Aplicar hasta inicio de floración.
Césped	Aplicar al inicio del crecimiento y continuar con intervalos de 3 - 4 semanas. Adicionalmente después de periodos de estrés o alto tráfico, heladas o resiembra.

RECOMENDACIONES DE USO

Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo utilizando únicamente agua. El producto no ejerce ninguna acción física ni química sobre el equipo de aplicación. Como mínimo lavar 3 veces con suficiente agua el equipo de aplicación después de usar el producto. Se recomienda empezar a aplicar **PHYLLUM MAX F** desde estados de crecimiento vegetativo y formación de frutos, realizando aplicaciones periódicas. Aumenta los factores inmunológicos de los cultivos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llene el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad, posteriormente agregue la dosis correcta de **PHYLLUM MAX F**, agite nuevamente hasta que se homogenice la mezcla y termine de llenar el tanque, posteriormente hacer la aplicación.

COMPATIBILIDAD: PHYLLUM MAX F, es compatible con la mayoría de los plaguicidas que se usan comúnmente. En caso de duda hacer una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No se conocen síntomas de fitotoxicidad cuando se aplican las dosis recomendadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Cuando utilice este producto póngase el equipo de protección personal: overol de mangas largas, mascarilla, anteojos, botas y guantes de hule. No coma, fume o beba durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto. Báñese después de cada jornada de trabajo con suficiente agua y jabón, la ropa de trabajo lávela antes de volverla a utilizar.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Este producto no debe almacenarse ni transportarse con forrajes, alimentos, medicamentos y utensilios de uso personal o pecuario. Manténgase el producto en un lugar fresco y aireado, en su envase original y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y a la luz, no es corrosivo.

SINTOMAS DE INTOXICACION: No presenta ningún síntoma de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: Si el paciente está consciente dé a beber suficiente agua. Busque atención médica inmediata.

INHALACION: Retire el paciente a un lugar ventilado y seco. Afloje las prendas de vestir.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente la parte afectada con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: Tratamiento sintomático. No tiene antídoto específico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y EL AMBIENTE: No aplique cerca de fuentes de agua, no contamine lagos, ríos o estanques. En caso de derrames recójalos con aserrín o algún material

absorbente e incorpórelo al campo de cultivo, los envases vacíos lávelos 3 veces perfórelos y llévelos al centro de recolección más cercano.

Importado y distribuido por:

Titular del registro:
AGROCHILE S.A.

<p>“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS” “EN CASO DE INTOXICACION LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA” “REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES” “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS” “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA” “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”</p>	
---	---

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El formulador y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Garantizamos el contenido del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado. El usuario asume el riesgo de los daños ocasionados por factores que escapan a la responsabilidad del formulador y adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.