

# DRACO 25 SC

**INSECTICIDA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**N° de Registro: 3508-3063**

**Titular del Registro: ANASAC PARAGUAY S.R.L.**

**País: PARAGUAY**

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

**Ingrediente Activo:**

**FIPRONIL** ..... **25% p/v**

**Solventes y emulsionantes, c.s.p** ..... **100% p/v**

## GENERALIDADES

**DRACO 25 SC** pertenece a una clase de insecticidas de la familia de los fenil pirazoles, este insecticida tiene efecto sobre el sistema nervioso central interfiriendo en la transmisión GABA (ácido gama amino butírico) sobre los canales del ión cloro, por tener una forma de acción distinta a todas las otras familias de insecticidas, este producto es ideal para rotaciones con el objeto de prevenir posibles resistencias.

## RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Arroz	Gorgojo acuático ( <i>Oryzophagus oryzae</i> )	120 cm <sup>3</sup> /100 kg	Antes de (hasta 30 días) con 1,8 litros de agua por cada 100 kg de semilla
Girasol Maíz	Hormigas podadoras ( <i>Acromymex spp.</i> )	12-16 cm <sup>3</sup> / ha	La dosis menor en mezcla con herbicida pre-emergente. La dosis mayor usarla como curativo en post-emergencia.
Pasturas	Tucuras ( <i>Dichroplus spp.</i> , <i>Rhammanthocerus pictus</i> <i>Tropinotus spp.</i> , <i>Chomachris</i> <i>miles</i> )	16 cm <sup>3</sup> / ha	Cuando se observen los primeros adultos o 10 mosquitas o saltonas por metro lineal.
Sorgo	Astilo moteado ( <i>Astylus Atromaculatus</i> )		Cuando el tercio medio de la panoja tenga los estambres expuestos.
En general Áreas cultivadas y no cultivadas	Hormiga minera ( <i>Atta sexdenis</i> ) Hormiga isaú ( <i>Atta vollenweideri</i> ) Hormiga colorada ( <i>Acromymex striatus</i> ) Hormiga negra del sud ( <i>Acromymex lobicomis</i> ) Hormiga negra común ( <i>Acromymex lundii</i> )	1 ml / 10 m <sup>2</sup>	Aplicar el producto directamente con el envase evitando el contacto con las manos, al lado del camino de abastecimiento (donde están cargando hojas). Próximo a los orificios activos.

Césped (parques, canchas de deportes)	Grillo topo ( <i>Scapteriscus spp.</i> )	0.1 – 0.2 ml/ha (cobertura total)	Una sola aplicación por año en primavera (preventiva) o en verano – otoño (curativa).
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (ml/100kg semillas o ha)	DOSIS (g. i.a./100kg semillas o ha)
Soja	Vaquita ( <i>Diabrotica Speciosa</i> )	200 ml	50 ml
	Picudos ( <i>Sternechus sp</i> )	200 ml	50 ml
	Broca de tallo ( <i>Elasmopalpus lignosellus</i> )	200 ml	50 ml
	Grillo ( <i>Anurogrillus sp</i> )	200 ml	50 ml
	Cuscudito marrón ( <i>Aracantus mourei</i> )	200 ml	50 ml

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

**DRACO 25 SC**, Tratamiento en húmedo del producto sobre la semilla, aplicando agua para mejor adherencia. Para un control eficiente. Se recomienda que la aplicación se realice con semillas mezcladas en forma homogénea con el producto, de modo de asegurar una buena cobertura. Con este fin se recomienda combinar **DRACO 25 SC** con 0,5 – 1,0 L de agua por cada 100 kilos y según tipo de semilla. Para obtener un buen cubrimiento, mezcle la dosis recomendada con la semilla en máquinas para tratamiento de semilla o en tambor giratorio, agitando hasta obtener una distribución homogénea. Adicionar 0,5 a 1,0 L de agua por cada 100 kilos de semilla, para lograr mayor adherencia.

### RESTRICCIONES DE USO

Por época de aplicación, no está afecta a carencias para el consumo humano. Las semillas tratadas con **DRACO 25 SC** deben ser destinadas únicamente para la siembra; no deben ser consumidas por el hombre ni por animales.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se puede mezclar con funguicidas. Es incompatible con productos de reacción alcalina. En caso de utilizarlo en mezcla se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** **DRACO 25 SC** no es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

### INICIO, NÚMERO E INTERVALO DE APLICACIÓN

Debe de aplicarse antes de realizar la siembra, es un tratamiento de semillas. Por el cual se realiza una sola vez en la temporada.

**TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** El ingreso al área de tratamiento de semillas debe ser con equipo completo de protección, o bien esperar 24 horas para ingresar sin equipo de protección.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.

INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR (cuando corresponda).

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos.

Durante la manipulación del producto usar delantal, protector facial, guantes y botas. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, protector facial, guantes y botas.

En caso de realizar una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales.

Para aplicaciones aéreas observar las disposiciones que a nivel regional ha establecido la autoridad competente.

No comer, beber o fumar durante la aplicación.

Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

#### **DESTINO DE LOS ENVASES**

LOS ENVASES VACÍOS DEBERÁN SER ENJUAGADOS TRES VECES (TRIPLE LAVADO) Y EL LÍQUIDO RESULTANTE AGREGARLO A LA PREPARACIÓN PARA SER PULVERIZADA, PERFORAR EL ENVASE Y ALMACENE EN LUGAR ADECUADO HASTA POSTERIOR RECICLADO.

**ANTIDOTO:** No posee específico.

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de ingestión accidental**, dar papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso (30 g de sulfato de sodio). Procurar asistencia médica de inmediato.

**Por salpicaduras en piel y ojos**, enjuagar con abundante agua limpia. No inducir el vómito.

#### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

**DRACO 25 SC**, es extremadamente tóxico para organismos acuáticos. Es tóxico para abejas y ligeramente tóxico para aves.

Conserve **DRACO 25 SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.

**Importado y distribuido por:**

**Titular del registro:**

**ANASAC PARAGUAY S.R.L.**

Lord Baden Powell n°857 - Asunción

Teléfono: +59521447739

**USO AGRICOLA  
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO  
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAMAR AL TELÉFONO 021-220-418 DEL CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”  
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA  
ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”  
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE  
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”**

**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”**  
**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”**  
**“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

#### **INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad. Por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingredientes Activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan a nuestro control el usuario es el responsable final, por tanto, no asumimos los riesgos de su aplicación y almacenaje.