

HUMMER 24 EC

HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

N° de Registro: 3425 - 2985

Titular del Registro: ANASAC PARAGUAY S.R.L.

País: PARAGUAY

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

CLODINAFOP PROPARGYL 24% p/v
 Solventes y emulsionantes, c.s.p. 100% p/v

GENERALIDADES

HUMMER 24 EC es un herbicida que es absorbido a través de las hojas y es transportado rápidamente hacia las zonas de crecimiento, inhibiendo el desarrollo de las malezas. Pocos días después de la aplicación las plantas presentan coloración amarillenta, sobre todo en las hojas superiores, que luego se tornan violáceas, pronunciándose más adelante hasta marchitamiento, necrosis y muerte de la planta. La acción del producto se nota por la facilidad con la que se desprenden las hojas terminales (hojas nuevas) ante una leve tracción.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Trigo	Avena (<i>Avena spp</i>)	150 cm ³ / ha	2 - 4 hojas hasta inicio de macollaje del cultivo y la maleza.
	Acevéñ (<i>Lolium multiflorum</i>) Maiz guayo (<i>Zea spp</i>) Pasto braquiaria (<i>Brachiaria decumbens</i>) Pasto kola'i (<i>Digitaria spp</i>)	200 a 250 cm ³ / ha	

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Debe ser aplicado con el volumen de agua necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar.

Aplicaciones terrestres: Se recomienda aplicar con un volumen de agua de 100-200 l/ha, una presión de 30-45 lb/pulg² y pastillas del tipo abanico plano (8002;8003;11002;11003). Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 8 km/h. Debe ser aplicado en postemergencia de la maleza, cuando ésta se encuentra en activo crecimiento y con buenas condiciones de humedad del suelo. No se recomienda realizar la aplicación cuando las malezas están sufriendo estrés hídrico, haya vientos superiores a 8 km por hora y/o rocío sobre el follaje.

RESTRICCIONES DE USO

No afecta los cultivos siguientes dentro de una rotación, si se sigue fielmente las instrucciones de la etiqueta. Necesita de 2 horas sin precipitación después de la aplicación para que el producto sea absorbido por el follaje de las malezas.

INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con herbicidas hormonales. Separar las aplicaciones de productos no compatibles 5 a 7 días de una de **Hummer 24 EC**.

COMPATIBILIDAD: se puede aplicar junto con metsulfuron metil para el control simultáneo de malezas gramíneas y hojas anchas. Además, es compatible con fungicidas como propiconazole y tebuconazole, para el control simultáneo de malezas gramíneas y enfermedades foliares en trigo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos que se recomienda, si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 4 Horas.

PERIODO DE CARENIA: 45 días.

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICACIÓN

Aplicar después de la emergencia de las malezas y antes que las más desarrolladas lleguen a inicio de macolla. En malezas anuales se obtienen mejores resultados aplicando en primeros estados de desarrollo, en activo crecimiento, con temperaturas medias y húmedas de suelo. En malezas perennes, los mejores resultados se obtienen cuando éstas presentan un desarrollo foliar que permita una apropiada absorción del producto, Puede aplicarse en cualquier momento después de las tres hojas del trigo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.

INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos.

Durante la manipulación del producto usar delantal, protector facial, guantes y botas. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, protector facial, guantes y botas.

En caso de realizar una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales.

Para aplicaciones aéreas observar las disposiciones que a nivel regional ha establecido la autoridad competente.

No comer, beber o fumar durante la aplicación.

Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTES

Contacte con las autoridades locales competentes y a la empresa distribuidora del producto. Utilice equipamiento de protección individual recomendado: delantal, protector facial, guantes y botas, traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek.

Aísle y señalice el área contaminada. En caso de derrames en aguas, se recomienda atrapar el material derramado en un recipiente para almacenar agua, detener el escurrimiento, no permitiendo que el producto

entre en alcantarillados, drenajes o cursos de agua. Excavar o poner barreras de bolsas de arena. Usar carbón activado para absorber la sustancia derramada que se ha dispersado en el agua. Usar tubos de succión para remover el material derramado. Usar una bomba de succión de la arena o de sedimentos que queden bajo el agua.

DESTINO DE LOS ENVASES

LOS ENVASES VACÍOS DEBERÁN SER ENJUAGADOS TRES VECES (TRIPLE LAVADO) Y EL LÍQUIDO RESULTANTE AGREGARLO A LA PREPARACIÓN PARA SER PULVERIZADA, PERFORAR EL ENVASE Y ALMACENE EN LUGAR ADECUADO HASTA POSTERIOR RECICLADO.

ANTIDOTO: No posee antídoto específico. APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO Y DE RECUPERACIÓN.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: ardor en la boca, malestar epigástrico, náuseas, vómitos, tos, trastornos respiratorios.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión accidental, lavado gástrico y vaciamiento estomacal con carbón activado.

En las irritaciones cutáneo-mucosas, el tratamiento sintomático es efectivo.

En los casos graves, con riegos de colapso, se indica oxigenoterapia, uso de vasoconstrictores y cuidados intensivos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

HUMMER 24 EC es virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves, fauna silvestre y organismos del suelo. Altamente tóxico para peces.

Conserve **HUMMER 24 EC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes, reguladores de crecimiento o semillas.

Importado y distribuido por:

Titular del registro:

ANASAC PARAGUAY S.R.L.

Lord Baden Powell n°857 - Asunción

Teléfono: +59521447739

USO AGRICOLA
INFLAMABLE DE 2ª CATEGORÍA - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAMAR AL TELÉFONO 021-220-418 DEL CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad. Por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingredientes Activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan a nuestro control el usuario es el responsable final, por tanto, no asumimos los riesgos de su aplicación y almacenaje.