

MULTIVOLT SC

INSECTICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

5180 -4970

Titular del Registro: ANASAC PARAGUAY

País: PARAGUAY

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

THIAMETOXAM 150 g/l

BIFENTRINA 100 g/l

Ingredientes inertes 750 g/l

GENERALIDADES

MULTIVOLT SC es un insecticida de amplio espectro y acción sistémico, contacto e ingestión. En el insecto afectado, muestra una rápida acción de contacto y estomacal, afectando el sistema nervioso del mismo. Interfiere con los receptores nicotínicos produciendo convulsiones nerviosas en el insecto que producen parálisis y muerte.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS cc/ha	OBSERVACIONES
Algodón	Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>) Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	300 -500	Aplicar al inicio de la aparición de la plaga. Utilizar la dosis mayor con alta infestación.
Trigo	Pulgón verde de los cereales (<i>Rhopalosiphum graminum</i>) Chinche verde pequeño (<i>Dichelops melacanthus</i>)	200 -400	Pulgón: iniciar aplicación cuando alcance los siguientes niveles: 10% de plantas infestadas desde la emergencia hasta el macollaje; 10 pulgones por macollo y cuando haya 10 pulgones por espiga. Chinche: aplicar el producto al inicio del desarrollo del cultivo, cuando el ataque es más severo.
Soja	Oruga de la hoja (<i>Anticarsia gemmatalis</i>) Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>) Chinche pequeño (<i>Piezodorus guildinii</i>) Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Chinche marrón (<i>Euchistus eros</i>)	300 -500	Aplicar al inicio de la aparición de la plaga. Orugas: aplicar cuando haya 20% de defoliación. Chinches: aplicar cuando hayan 2 chinches por batida de paño, si es para semilla con 1 chinche por batida de paño.
Maíz	Chinche barriga verde (<i>Dichelops melacanthus</i>)	300 -500	Aplicar al inicio del desarrollo del cultivo cuando el ataque es más severo.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme. Antes de aplicar el producto calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. En aplicaciones terrestres aplicar entre 100 – 200 lts de agua /ha, utilizando boquillas de cono y una presión entre 20-80 psi. En aplicaciones aéreas el volumen de aplicación debe ser de 30 a 40 Lt/ha.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Verificar la correcta calibración del equipo antes de iniciar la aplicación. Poner agua hasta la mitad del tanque del equipo aplicador, agregar la cantidad necesaria del producto de acuerdo a la dosis recomendada en esta etiqueta, manteniendo el agitador en marcha y completar con el resto del volumen de agua.

COMPATIBILIDAD: MULTIVOLT SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas más comúnmente utilizado. En caso de duda con respecto a la compatibilidad del producto se recomienda efectuar siempre pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se debe esperar 24 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección.

CARENCIAS: 21 días en algodón, 40 días en maíz, 42 días en trigo y 30 días en soja.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO. NO MANIPULAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE CON LAS MANOS Y UTILIZAR EN LUGARES CON ADECUADA VENTILACIÓN. Durante su manipulación, evitar el contacto con la piel y mucosas, no inhalar vapores del producto formulado ni trabajar en la neblina de pulverización. Use siempre elementos de protección adecuados: overol de manga larga, guantes de neopré, botas de goma, gafas protectoras, capuchas impermeables y máscara con filtros. Luego de su utilización, Recuerde lavarse bien las manos antes de ingerir alimento, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño, báñese con suficiente agua y jabón, cámbiese por ropa limpia, nunca lave su ropa de trabajo y su equipo de protección junto con la ropa de uso diario. El uso de este producto es exclusivamente agrícola, aplicar solo las dosis recomendadas, no pulverizar en contra del viento o con vientos superiores a los 10 km/h. No utilizar equipos con pérdida y no destapar boquillas o tuberías con la boca.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular: lavar los ojos con agua potable por al menos 15 minutos. En caso de irritación acudir al médico.

En caso de contacto cutáneo: Retirar inmediatamente la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con agua fría y jabón.

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco, Solicite instrucciones médicas.

En caso de ingestión: Acudir inmediatamente a un centro asistencial. Dar a beber agua, solo si la persona está consciente.

ANTIDOTO: No se conoce antídoto específico, se recomienda realizar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua, inutilizar los envases vacíos y entregarlos al centro autorizado de acopio de envases vacíos de agroquímicos, realizar triple lavado de envases.

MULTIVOLT SC es prácticamente no tóxico para aves, extremadamente tóxico para peces y altamente tóxico para abejas.

Importado y distribuido por:

ANASAC PARAGUAY
Lord Baden Powell n°857 - Asunción
Teléfono: +59521447739

Titular del registro:

ANASAC PARAGUAY
Lord Baden Powell n°857 - Asunción
Teléfono: +59521447739

**USO AGRICOLA
NO INFLAMABLE, NO EXPLOSIVO, NO CORROSIVO
CATEGORÍA II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAMAR AL TELÉFONO 021-220-418 DEL CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA
ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”.
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES
DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.