

FUNGICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

143-F3/NA

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

AZOXYSTROBIN	200 g/l
DIFENOCONAZOLE	125 g/l
Aditivos c.s.p	1 l

GENERALIDADES

TRONKAL es un fungicida potenciado en base a dos ingredientes activos de eficaz acción sobre hongos. Azoxystrobin, potente inhibidor de la germinación de esporas y Difenconazole inhibidor de la síntesis del ergosterol, del tubo germinativo y la síntesis del ADN del hongo. Ambos de tipo de acción sistémica, combinados generan una acción preventiva y curativa, además de erradicante aplicado en las dosis recomendadas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (l/ha)	P.C (Período de carencia)
Arroz (<i>Oryza sativa</i> L.)	Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>)	0.50	28 días
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Oidio (<i>Oidium</i> sp.)	1.50	N/A
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.40	14 días
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Mancha de asfalto (<i>Phyllachora maydis</i>)	0.40	35 días
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Mancha parda (<i>Alternaria longipes</i>)	0.40	14 días

Volumen de agua: Arroz y Tabaco: Descarga de 400 litros de agua. Rosa: Descarga de 1500 litros de agua. Tomate riñón: Descarga de 1600 litros de agua. Maíz: Descarga de 200 litros de agua por hectárea, previa calibración del equipo.

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

ARROZ: debe ser aplicado con niveles iniciales de infección o cuando aparezcan los primeros síntomas. Se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 7 días. **ROSA:** debe ser aplicado cuando exista la presencia de un 2% de la plaga como mínimo en las plantas. Se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 7 días. **TOMATE RIÑÓN:** Se recomienda utilizar el producto cuando exista un máximo de 2 % de ataque. Se debe aplicar en dos ocasiones, con intervalos de 7 días. **MAÍZ:** Realizar dos aplicaciones con intervalos de 7 días, aplicar vía foliar, cuando exista máximo 2% de severidad. **TABACO:** Se recomienda utilizar el producto cuando exista un umbral de 2 % de ataque. Se debe aplicar en dos ocasiones, con intervalos de 7 días.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Verificar la correcta calibración del equipo antes de iniciar la aplicación. Poner agua hasta la mitad del tanque del equipo aplicador, agregar la cantidad necesaria del producto de acuerdo a la dosis recomendada en esta etiqueta, manteniendo el agitador en marcha y completar con el resto del volumen de agua.

COMPATIBILIDAD: **TRONKAL** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, se recomienda efectuar siempre pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se debe esperar 24 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO. NO MANIPULAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE CON LAS MANOS Y UTILIZAR EN LUGARES CON ADECUADA VENTILACIÓN. Durante su manipulación, evitar el contacto con la piel y mucosas, no inhalar vapores del producto formulado ni trabajar en la neblina de pulverización. Use siempre elementos de protección adecuados: overol de manga larga, guantes de neopren, botas de goma, gafas protectoras, capuchas impermeables y máscara con filtros. Luego de su utilización, Recuerde lavarse bien las manos antes de ingerir alimento, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño, báñese con suficiente agua y jabón, cámbiese por ropa limpia, nunca lave su ropa de trabajo y su equipo de protección junto con la ropa de uso diario.

El uso de este producto es exclusivamente agrícola, aplicar solo las dosis recomendadas, no pulverizar en contra del viento o con vientos superiores a los 10 km/h. No utilizar equipos con pérdida y no destapar boquillas o tuberías con la boca.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular: lavar los ojos con agua potable por al menos 15 minutos. En caso de irritación acudir al médico.

En caso de contacto cutáneo: Retirar inmediatamente la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con agua fría y jabón.

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco, Solicite instrucciones médicas.

En caso de ingestión: Acudir inmediatamente a un centro asistencial. Dar a beber agua, solo si la persona está consciente.

ANTIDOTO: No se conoce antídoto específico, se recomienda realizar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua, inutilizar los envases vacíos y entregarlos al centro autorizado de acopio de envases vacíos de agroquímicos, realizar triple lavado de envases.

TRONKAL es ligeramente tóxico para aves, moderadamente tóxico para peces y especies acuáticas.

PRESENTACIONES:**Importado y distribuido por:**

FARMAGRO
Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos
Julio Arosemena N. 1-6-7 intersección av. 38
C MZ. 263. Guayaquil, Ecuador
Tel (042) 590 600 Fax ext. 172

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.
Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,
conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3
Oficina 31 S. Quito. Ecuador 6020273
Email: agrochile@anasac.cl

**USO AGRICOLA
CATEGORIA II - MODERADAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELÉFONO 1800-VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS AL DÍA O AL TITULAR DEL REGISTRO: AGROCHILE TEL: (593) 26020309

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA
ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”.
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS
FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL
REINGRESO”**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.

